

REGIONES FITOCLIMÁTICAS

TIPO FITOCLIMÁTICO

ÁRIDO

III(IV) Sahariano submediterráneo

MEDITERRÁNEOS

IV(III) Mediterráneo subsahariano

IV1 Mediterráneo genuino

IV2 Mediterráneo genuino

IV3 Mediterráneo genuino

IV4 Mediterráneo genuino

IV(VI)1 Mediterráneo subnemoral

IV(VI)2 Mediterráneo subnemoral

IV(VII) Mediterráneo substepario

NEMORALES

VI(IV)1 Nemoromediterráneo subnemoral

VI(IV)2 Nemoromediterráneo genuino

VI(IV)3 Nemoromediterráneo genuino

VI(IV)4 Nemoromediterráneo submediterráneo

VI(VII) Nemoral substepario

VI(V) Nemoral genuino

VI Nemoral genuino

OROBOREALOIDES

VIII(VI) Oroborealoide nubnemoral

X(VIII) Oroborealoide genuino

X(IX)1 Oroarticoide termoaxérico

X(IX)2 Oroarticoide termoxérico

0 100 200 km

Fuente: J.L. Allué Andrade, 1990

Elaborado por: Instituto Geográfico Nacional. Atlas Nacional de España